แบบฟอร์ม Observe
และเฝ้าระวังADR จากยา Adenosine (6 mg/2 ml)

qSOFA	≥ 2 คะแนน รายงานแพทย์
1.GCS < 15 คะแนน	1 คะแนน
2.RR ≥ 22 / min	1 คะแนน
3.Systolic BP ≤ 100 mmHg	1 คะแนน

ข้อบ่งชี้การให้ยา	การเตรียมยา	ADR
1.Supra Venticular Tachycardia	**1.เตรียมยา 6 mg double syringe technique , repeat 12mg and repeat 12 mg if not improve(Max 3 dose หรือ 30 mg)**	1.Hypotension (Keep MAP 60- 65) 2.Bradycardia (50/min) 3.หายใจหอบ (>22) สูตร MAP = $\frac{2DBP+SBP}{3}$

ผู้เตรียม ลงชื่อ ..... .ผู้ตรวจสอบ ลงชื่อ ..... ผู้ให้ยา .....

( ) ( ) ( )

ประเมินการเกิด ADR			
1.Hypotension	2. Bradycardia	3.หายใจหอบ	ผู้ประเมินผล ลงชื่อ.....
O ไม่เกิด O เกิด	O ไม่เกิด O เกิด	O ไม่เกิด O เกิด	( )

ว/ด/ป เวลา	T (°c)	P/HR /min	R /min	BP (mmHg	MAP	GCS	qSOFA	SOS	Urine	O2sat (%)	DTX (mg%)	IV Fluid	Medication	Clinical sign	ลายมือชื่อ

แบบฟอร์ม Observeและเฝ้าระวังADR จากยา Adenosine (6 mg/2 ml)

ว/ด/ป เวลา	T (oc)	P/HR /min	R /min	BP (mmHg)	MAP	GCS	qSOFA	SOS	Urine	O2sat (%)	DTX (mg%)	IV Fluid	Medication	Clinical sign	loss of reflex	ลายมือชื่อ