แบบติดตามการใช้ยาความเสี่ยงสูง : Dopamine Inj.(250 mg/10 ml)

Diagnosis		
Underlying disease		
เหตุผลในการสั่งใช้		
ขนาด / วิธีบริหารยา	☐อัตราส่วน 1:1Dopamine(mg): Solution(ml)เตรียมโดยใช้ Dopamine ….. mg (…. cc) + D5W .....cc ☐อัตราส่วน 2:1Dopamine(mg): Solution(ml)เตรียมโดยใช้ Dopamine ….. mg (…. cc) + D5W .....cc ใช้ infusion pump ในการให้ยาเสมอ	**เภสัชกร :**
วันเวลาที่บริหารยา	**วันที่เริ่มใช้ …… เวลาที่เริ่มใช้ ..... IV Rate เริ่มต้น ..... วันที่หยุดใช้..... เวลาที่หยุดใช้ .....**	

ว/ด/ป	**Patient Assessment / Nursing Care**				IV Fluid	Medication	ADR									
	T(°C).	P	RR	BP(mmHg)			●HR >100		●HR<60		●BP ต่ำ		♦ คลื่นไส้/อาเจียน		♦ Tissue necrosis	
							เกิด	ไม่เกิด	เกิด	ไม่เกิด	เกิด	ไม่เกิด	เกิด	ไม่เกิด	เกิด	ไม่เกิด

ควรติดตามดู BP , HR , Urine output , EKGหากผู้ป่วยแจ้ง ใจสั่น ปวดศีรษะ คลื่นไส้ อาเจียน หอบเหนื่อย

หากเกิดSevere hypertension ,Cardiac arrhythmia ควรแจ้งแพทย์ทันที !!!หาก urine output < 0.5 ml/Kg/hr consult แพทย์

การแก้ไขเบื้องต้น :ลดอัตราเร็วหรือหยุดยา และให้ supportive treatment

ผล Urine ก่อนให้ยา **I=…….. ml O=…… ml**

ชื่อ-สกุลผู้ป่วย	**อายุปี**	**น้ำหนัก กก.**	**HN**	**AN**	**แพทย์**	**เตียง**